

de $\alpha \leq 0,05$. A análise estatística foi feita pelo teste *t* de Student, Mann-Whitney e coeficiente de Pearson para correlações.

Resultados: Nas 21 pacientes com PE a média do V_{max} foi de 982,69 $\mu\text{mol/L}$ de céls/h enquanto a média para as gestantes normais foi de 584,73 $\mu\text{mol/L}$ de céls/h. O K_m foi de 59,31 $\mu\text{mol/L}$ nas PE e de 59,46 $\mu\text{mol/L}$ nas normais. Houve correlação

das variáveis clínicas com o V_{max} e não com o K_m . Conclusões: o V_{max} foi maior nas pacientes com PE quando comparada com gestantes normais. Houve correlação das variáveis clínicas com o V_{max} e não com o K_m .

Palavras-chave: Gravidez normal. Hipertensão na gravidez, investigação e tratamento.

RBGO 21 (3): 177, 1999

Resumo de Tese

Expressão Endometrial das Proteínas de Membrana Reguladoras do Sistema Complemento CD59, DAF, MCP e CR1 em Mulheres Normais e Naquelas Submetidas à Hiperestimulação Ovariana

Autor: Rosana Rita N. Fonzar Marana
Orientador: Prof. Dr. Rui Alberto Ferriani

Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, na Área de Tocoginecologia, em 11/03/99.

Introdução: Os tecidos do trato reprodutivo expressam e sintetizam componentes do sistema complemento (SC) ao longo do ciclo menstrual, em estreita correlação com os níveis hormonais, o que sugere a necessidade de controle de sua ativação. Os ciclos submetidos à hiperestimulação ovariana podem apresentar modificações na expressão dessas proteínas em decorrência das altas concentrações hormonais.

Objetivos: Avaliar a expressão endometrial das proteínas reguladoras do SC ao longo do ciclo menstrual normal e de pacientes submetidas a hiperestimulação ovariana (HO) para fins de fertilização assistida e transferência de embriões (FIV-TE).

Casuística e Métodos: Foram avaliadas a expressão do CD59, DAF, MCP e CR1, no endométrio de 32 mulheres normais durante as diferentes fases do ciclo menstrual e de 10 pacientes submetidas à HO durante a fase lútea intermediária através da técnica de imuno-histoquímica.

Resultados: O CD59 como o DAF, se expressaram

no endométrio durante a fase secretora, em ambos os grupos de mulheres. O CD59 teve marcação mais intensa na fase secretória intermediária enquanto que o DAF, nas fases secretória intermediária e tardia. Houve expressão da MCP no epitélio glandular em todo o ciclo menstrual, com diminuição na subfase proliferativa intermediária. O CR1 não foi detectado em nenhum dos grupos. Não houve marcação para nenhum anticorpo estudado, no estroma endometrial.

Conclusões: As proteínas reguladoras do SC, CD59, DAF e MCP estão presentes no endométrio humano normal e naqueles hiperestimulados, com exceção do CR1. A subfase em que o CD59 foi demonstrado sugere que o mesmo tenha grande importância durante o processo de implantação do embrião. O DAF, da mesma forma, deve contribuir para que ocorra a nidação e o início da gestação de modo adequado, através do controle do SC.

Palavras-chave: Endométrio, investigação, Ciclo menstrual.

RBGO 21 (3): 177-178, 1999

Resumo de Tese

Mulheres Infectadas pelo HIV: O Impacto na Anticoncepção, no Comportamento Sexual e na História Obstétrica

Autor: Jarbas Magalhães
Orientador: Prof. Dr. Paulo César Giraldo

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Medicina, área de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, para obtenção do título de Mestre em Medicina, em 30/9/98.

A transmissão heterossexual do vírus da imunodeficiência adquirida é predominante em quase todo o mundo e as mulheres representam dois terços das pessoas infectadas por esta via. Portanto, as decisões sobre a anticoncepção, o comportamento sexual e a vida reprodutiva, ganharam muita importância, embora existam poucos estudos sobre o tema nos últimos anos. Para avaliar o impacto da infecção pelo HIV na anticoncepção, no comportamento sexual e na história obstétrica de mulheres HIV+, desenvolveu-se um estudo descritivo, de corte transversal, realizado por intermédio de um questionário ao qual foram submetidas 140 mulheres contaminadas pelo HIV, no Ambulatório de Infecções Genitais do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas. A análise estatística foi realizada utilizando-se os testes de Qui-Quadrado, Exato de Fisher e o de McNemar para amostras emparelhadas, com significância estatística de 5%. A maioria da população estudada foi de mulheres jovens, de baixa escolaridade e com um contingente importante de viúvas. Encontrou-se um nítido aumento na prevalência do uso de métodos anticoncepcionais, especialmente dos

preservativos e da ligadura tubária, somado a uma diminuição expressiva do número de parceiros e de relações sexuais, no período decorrido após o conhecimento da soropositividade, porém 30% das mulheres HIV+ ainda permaneceram sem usar método anticoncepcional. Descobriu-se também que metade dos parceiros das mulheres infectadas pelo HIV+ fazia uso consistente de preservativos, porém, uma grande parcela deles permaneceu sem nunca usá-los. Tais achados pareceram explicar a ocorrência de 26 gestações no período pós-soroconversão, com uma taxa de aborto provocado de 23,1%. Concluiu-se que o conhecimento da infecção pelo HIV exerceu forte impacto nas mulheres HIV+ estudadas, levando a profundas modificações nas práticas de anticoncepção e de comportamento sexual e, conseqüentemente, na sua história obstétrica. Espera-se que atividades de Planejamento Familiar sejam cada vez mais estimuladas e desenvolvidas nos serviços que atendam as mulheres infectadas pelo HIV.

Palavras-chave: Anticoncepção. AIDS. Comportamento sexual.

AVISO

Comunicamos que a partir de abril, a **FEBRASGO enviará aos sócios quites do corrente ano, o selo da **FEBRASGO** 1999.**

O Selo deverá ser colado no verso da carteira no local correspondente ao ano de 1999.

Caso não tenha recebido sua carteira, entre em contato com a **FEBRASGO o mais rápido possível.**