

310 Ciclooxygenase-2 nos carcinomas ductais de mama invasivos com componente ductal *in situ* e no epitélio adjacente

Cyclooxygenase-2 in invasive ductal carcinoma with ductal component in situ and in adjacent epithelium

VILMAR MARQUES DE OLIVEIRA

MARIA MARTA MARTINS

ADRIENNE PRATTI LUCARELLI

GIULIANA CÁSSIA MORRONE TAROMARU

JOSÉ FRANCISCO RINALDI

MARIA ANTONIETA LONGO GALVÃO SILVA

SEBASTIÃO PIATO

317 Biópsia de fragmento em nódulos mamários suspeitos com até 10 mm

Core biopsy in suspicious solid breast lesions up to 10 mm

HÉLIO SEBASTIÃO AMÂNCIO DE CAMARGO JÚNIOR

MARCIA MARTOS AMÂNCIO DE CAMARGO

SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA

MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA

Artigo de Revisão

324 Tratamento atual dos miomas

Treatment of leiomyomas

HELENA VON EYE CORLETA

EUNICE BEATRIZ MARTIN CHAVES

MIRIAM SIGRUN KRAUSE

EDISON CAPP

Resumo de Tese

329 Análise imuno-histoquímica do fibroadenoma mamário humano por meio do antígeno de proliferação celular ki-67 durante as fases folicular e lútea do ciclo menstrual

MYCHELY FERNANDES RÉGO

Immunohistochemical analysis of human mammary fibroadenoma by cell proliferation antigen ki-67 during the follicular and luteal phases of menstrual cycle

329 Fatores de angiogênese na pré-eclâmpsia e a correlação com os níveis da pressão arterial média

PATRICIA GONÇALVES TEIXEIRA

Angiogenic factor in preeclampsia and the correlation with mean arterial pressure

Agenda

330 Agenda

Errata:

Na edição anterior, o último parágrafo do artigo original "Correlação entre os níveis de proteína C reativa ultrasensível e as características clínicas e laboratoriais em mulheres com síndrome do ovário policístico" (página 241) saiu incompleto. O correto seria:

"Por fim, considerações devem ser feitas a respeito da aplicabilidade prática dos nossos achados. Entendemos que os nossos achados contribuem para a compreensão da SOP como uma doença de manifestações metabólicas precoces. O dano endotelial parece se apresentar de forma subclínica, mesmo em idade jovem. Portanto, um melhor entendimento destes aspectos acrescenta e reforça o embasamento científico que tem norteado a abordagem diagnóstica e terapêutica da mulher com SOP, vislumbrando uma redução dos riscos à saúde a curto, médio e longo prazo."